

EXAMEN MIOFUNCIONAL OROFACIAL- MBGR

Nombre: _____ N° _____

Fecha de evaluación: / / edad: ____ años y ____ meses FN: / /

- 1. Postura corporal** sumar los puntos atribuidos a los ítems: cabeza y hombros (mejor resultado -0 y peor-7) observar al paciente en pie y descalzo

Cabeza [] sumar los punto (mejor resultado =0 y peor =4) [flexión y extensión= si] [rotación =no] [inclinación= tal vez]

Frontal:	(0) normal	(1) Rotación	(2) inclinación D	(1) inclinación I
Lateral:	(0) normal	(1) rotación	(2) inclinación D	(1) inclinación I

Hombros [] sumar los puntos (mejor resultado =0 y peor =3)

Frontal:	(0) normal	(1) elevado D	(1) elevado I
Lateral:	(o) normal	(1) rotación	(1) anteriorizado

Observcion: _____

2. MEDIDAS FACIALES, MOVIMIENTOS MANDIBULARES Y OCLUSION

Rostro (mantener los labios en contacto, tomar cada medida 3 veces con el paquimetro y sacar el promedio)

ROSTRO	1° medida (mm)	2° medida (mm)	3° medida (mm)	Promedio (mm)
Tercio medio de la cara (glabella al subnasal)				
Tercio inferior de la cara (subnasal a gnato)				
Altura de la cara- AL (glabella a gnato) (suma del tercio medio con el interior)				
Ancho de la cara- AN(prominencia de los arcos zigomáticos)				
Canto externo de ojo derecho a la comisura del labio derecho				
Canto externo de ojo izquierdo a la comisura del labio izquierdo				
Labio superior (subnasal al punto más inferior de labio superior)				
Labio inferior (del punto más superior del labio inferior al gnato)				

Movimientos mandibulares y oclusión (usar el paquimetro y lápiz, tomar cada medida 3 veces y promediar)

Movimientos mandibulares y oclusión	1° medida (mm)	2° medida (mm)	3° medida (mm)	Promedio (mm)
Entrecruzamiento vertical-EV (overbite) (con los dientes en oclusión, marcar en el vestibulo de los incisivos inferiores la cara incisal de los incisivos superiores y medir la distancia de esa marcación hasta la cara incisal de los incisivos inferiores; en la mordida abierta medir la distancia entre las caras incisales de los dientes incisivos superior e inferior, en el plano vertical y el resultado será negativo)				
Entrecruzamiento horizontal- EH (overject) (medir la distancia entre las caras incisales de los incisivos superiores e inferiores, en el plano horizontal)				
Lateralización mandibular hacia la derecha (marcar la línea media dentaria de la arcada superior en arcada inferior, llevar la mandíbula para la derecha hasta medir la distancia entre la marcación de la línea media superior)				
Lateralización mandibular hacia la izquierda (marcar a línea media dentaria la arcada superior en arcada inferior, llevar a mandíbula para la izquierda y medir la distancia entre la marcación y línea media superior)				
Distancia interincisal máxima activa –DMA (del incisivo central o lateral superior al interior con máxima abertura de la boca)				
Abertura de la boca (DMA+ EV)				
DIMA con el ápice de la lengua tocando la región alveolar (DIMALA)				
Calcular: $\frac{DIMALA}{DMA} \times 100$				

- 3. EXAMEN EXTRAORAL** sumar las puntuaciones del análisis facial, labios y masetero (mejor resultado-0 y peor-18)

Análisis facial: sumar los puntos atribuidos al patrón frontal y lateral (mejor resultado= 0 y peor = 5)
 Observar al paciente en pie y sin zapatos

Patrón frontal [] sumar todas las puntuaciones (mejor resultado = 0 y peor =3)

Tipo facial (comparar altura (AL) con ancho (AN):	(0) PRMEDIO (AL similar a AN)	(1) largo(al >AN)	(1) corta (AN >AL)
proporción facial: (comparar altura de los tercio medio o inferior) (comparar canto externo del ojo a la comisura del lado D con el lado I)	(0) similares	(1) tercio inferior mayor (0) Similares	(1)Tercio inferior menor (1) asimétrica

Patrón lateral [] sumar todas las puntuaciones (mejor resultado =0 y peor =2)

Tipo facial	(0)Tipo I (recto)	(1) tipo II (convexo)	Tipo III(cóncavo)
Angulo nasolabial:	(0)Próximo a 90°-110°	(1)Agudo (<90°)	(1)Obtuso (>110°)

Observaciones: _____

Labios [] sumar todas las puntuaciones (mejor resultado=0 y peor= 10)

Posición habitual	(0) Cerrados (2)entreabiertos	(1) Cerrados con tensión (2)Cerrados con contacto dentario	(2)A veces abiertos, a veces cerrados (3)abiertos
Mucosa externa:	(0) normal	(1) con saliva	(1) seca (2) herida
Forma: - superior: -inferior :	(0) normal (0) normal	(1) en ala de gaviota (1° y 2° arco de cupido) (1) con eversión discreta	(2) con eversión acentuada
Tamaño del superior	(0) cubre 2/3 de los incisivos	(1)Cubre más que 2/3	(2)Cubre menos que 2/3

Observaciones: _____

Masetero [] (mejor resultado= 0 y peor = 2) se debe realizar a través de la observación visual y palpación

En reposo	(0)relajado	(1) contraído (apretamiento dentario)
Reclutamiento durante la contracción isométrica:	(0) simultaneo	(1) primero lado D (1) primero lado I

4.EXAMEN INTRAORAL sumar los puntos de labios, lengua, mejillas, paladar, tonsilas, dientes y oclusión (mejor resultado= 0 y peor = 57)

Labios [] sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor=5)

Mucosa interna: (0) normal (1) con marcas de dientes (2) heridas
Frenillo superior: fijación en el borde del alveolar: (0) adecuada (1) baja Espesura: (0) normal (1) alterada (describir):

Observaciones: _____

Lengua [] sumar todos los puntos (mejor resultado=0 y peor= 17)

Postura habitual:	no observable	(1) en el piso	(1) punta baja y dorso alto	(1) interdental
Simetría:	(0) si	(1) no (describir)		
Grosor	(0) adecuada	(1) disminuido		(2) aumentado
Tamaño:	(0) adecuada	(1) aumentada (grande para la cavidad oral)		
Mucosa:	(0) normal (1) marcas de dientes (lugar):	(1) geográfica	(1) fisurada (1) marcas de aparato(lugar):	(2) con heridas
Frenillo: Extensión:	(0) normal	(1) largo		(1) corto
Fijación en lengua:	(0) parte media	(1) delante de la parte media(C. con ins. A)		(2) en el ápice (anquilogl.)
Fijación en suelo:	(0) entre las carúncula	(1)entre la cresta alveolar y las carúnculas		(2) cresta alveolar
Otras características:	(0) ausentes	(1) forma de corazón protrusión		(1) fibroso

Observaciones: _____

Mejillas [] sumar todos los puntos (mejor resultado=0 y peor = 8)

Mucosa:	(0) normal	(1) marca de dientes o del aparato D (1) marca de dientes o del aparato I	(1) línea aba (marca) D (1) línea aba (marca)I	(2) herida D (2) herida I
----------------	------------	--	---	------------------------------

observaciones: _____

PALADAR [] sumar todos los puntos (mejor resultado =0 y peor= 8)

Duro:	Profundidad:	(0) normal	(1) reducida (bajo)	(2) Aumentada (alto)
	Ancho:	(0) normal	(1) aumentada (amplio)	(2) reducida (estrecho)
Velo del paladar	Simetría:	(0) presente	(1) ausente	
	Extensión	(0) adecuada	(1) largo	(2) corto
Úvula:	(0) normal	(1) alterada (describir):		

Observaciones: _____

Tonsilas palatinas [] sumar todos los puntos 8 mejor resultado = 0 y peor =4)

Presencia:	presentes	extirpadas	no observadas
Tamaño:	(0) normal	(1) hipertrofia D.	(1) hipertrofia I.
Coloración:	(0) normal	(1) hiperemia D.	(1) hiperemia I.

Observaciones: _____

Dientes [] sumar todos los puntos (mejor resultado =0 y peor = 10)

Dentadura:	decidua	mixta	permanente	
Nº de dientes	superior D _____	superior I _____	inferior D _____ inferior I _____	
Ausencia de dientes	(0)no	(1) si (elementos) _____		
Salud oral: dientes:	(0) buena	(1) regular		(2) mala
Encías:	(0) buena	(1) regular		(2) mala
Uso de prótesis:	No	removible	fija	parcial total

Observaciones: _____

Oclusión [] sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor= 10)

Línea media:	(0) adecuada	(1) desviada D.	(2) desviada I
Clasificación de Angle:	Lado D (0) clase I	(1) clase II div. 1°	(1) clase II div. 2° (2) clase III
	Lado I. (0) clase I	(1) clase II div. 1°	(1) clase II div. 2° (2) clase III
Guía de desoclusión	(0) presente	(1) ausente D.	(1) ausente I.
Relación horizontal	(0) adecuada (EH entre 1 a 3 mm)	(1) mordida bis a bis (EH = 0mm)	(1) resalte acentuado (EH > 3mm) (1) mordida cruzada ant. (EH < 0mm)
Relación vertical	(0) adecuada (ev. entre 1 y 3mm)	(1) sobremordida (EV > 3mm)	(1) mordida abierta post. D. (1) mordida abierta anterior (ev < 0mm) (1) mordida abierta post. I.
Relación transversal:	(0) adecuada	(1) mordida cruzada posterior D.	(1) mordida cruzada posterior I.
Uso de aparato	no	móvil	fijo

Observaciones: _____

5. movilidad sumar los puntos de labios, lengua, velo del paladar y mandíbula (mejor resultado =0 y peor =54)

Labios [] sumar todos los puntos (mejor resultado= 0 y peor =16) * ejecutar con los dientes ocluidos

	Realiza con precisión	Realiza sin precisión	No realiza
Protrusión cerrados*	(0)	(1)	(2)
Retracción cerrados*	(0)	(1)	(2)
Protrusión abiertos*	(0)	(1)	(2)
Protrusión cerrados hacia la D*	(0)	(1)	(2)
Protruir cerrados hacia la I *	(0)	(1)	(2)
Estallar protruidos(besos)	(0)	(1)	(2)
Estallar protruidos(sonrisas)	(0)	(1)	(2)

Observaciones: _____

Lengua [] sumar todas las puntuaciones (mejor resultado=0 y peor= 16)

	Realiza con precisión	Realiza sin precisión	No realiza
Protruir	(0)	(1)	(2)
Tocar el ápice secuencialmente en las comisuras D/I y en los labios S/I	(0)	(1)	(2)
Tocar con el ápice la región alveolar	(0)	(1)	(2)
Tocar con el ápice la mejilla D	(0)	(1)	(2)
Tocar con el ápice la mejilla I	(0)	(1)	(2)
Efectuar el chasquido con el ápice	(0)	(1)	(2)
Succionar la lengua contra el paladar	(0)	(1)	(2)
Vibrar	(0)	(1)	(2)

Observaciones: _____

Paladar blando [] sumar todos los puntos (mejor resultado =0 y peor=4)

Emitir "a" repetidamente	Movimiento adecuado (0)D (0) I	Movimiento reducido (1)D (1) I	Ausencia de movimiento (2)D (2) I
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Observaciones: _____

Mandíbula [] sumar todas las puntuaciones (mejor resultado =0 y peor=18)

	Adecuada	Reducida	Aumentada	No realiza	Con desvío		Con ruido	Con dolor
Abertura de boca	(0)	(1)	(1)	(2)	(1)D	(1)E	(1)	(1)
Valores esperados: niños =35 a 50 mm/ adulto=40 a 55m								
Oclusión de la boca	(0)	-	-	-	(1)D	(1)E	(1)	(1)
Lateralizar hacia la D	(0)	(1)	(1)	(2)	-	-	-	-
Lateralizar hacia la I	(0)	(1)	(1)	(2)	-	-	(1)	(1)
Valores esperados: niños (6 a 12 años) = 6 a 10mm/ adulto = 8 a 12 mm								

Observaciones: _____

6. DOLOR DURANTE LA PALPACIÓN [] sumar todos los puntos 8mejor resultado =0 y peor= 10)

	Ausente	Presente
Temporal	(0)D (0) I	(1) D (1) I
Masetero superficialmente	(0)D (0) I	(1) D (1) I
Trapezio	(0)D (0) I	(1) D (1) I
Esternocleidomastoideo	(0)D (0) I	(1) D (1) I
ATM	(0)D (0) I	(1) D (1) I

Observaciones: _____

7. TONICIDAD [] sumar todos los puntos (mejor resultado =0 y el peor =10)

	normal	disminuido	Aumentado
Labio superior	(0)	(1)	(1)
Labio inferior	(0)	(1)	(1)
Mentón	(0)	(1)	(1)
Lengua	(0)	(1)	(1)
Mejilla derecha	(0)	(1)	(1)
Mejilla Izquierda	(0)	(1)	(1)

Observaciones: _____

8. FUNCIONES OROFACIALES sumar todos los puntos de respiración, masticación, deglución, habla y voz (mejor resultado = 0 y peor=103)

Respiración [] sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor= 7)

Si esta alterada, es de origen [] funcional [] estructural [] otra _____

Tipo:	(0) medioinferior	(1) mediosuperior	(1) otro (describir):
Modo:	(0) nasal	(1) oronasal	(1)oral [] silente []ruidoso
Flujo nasal	Al llegar (0) semejante entre las narinas	(1)asimetría leve	(1) asimetría acentuada
(usar espejo)	Después de higienizar (0) semejante entre las narinas	(1)asimetría leve	(1) asimetría acentuar
Posibilidad de uso nasal*:	(0) dos minutos o más	(1) entre uno y dos minutos	(2) menos de un minuto

Observaciones: _____

**para evaluar el uso nasal se le pide al paciente cerrar la boca y respirar normalmente por la nariz, se observa si consigue respirar por 2minutos manteniendo la boca cerrada o más, si logra esto es señal de que puede respirar por la nariz y no hay obstrucción, revisar si no puede mantener la boca cerrada por una alteración oclusal.*

Masticación: [] sumar todos los puntos (mejor resultado=0 y peor=10)

Si esta alterada es de origen [] funcional [] anatómica [] ATM [] otro _____

Masticación habitual [] (utilizar siempre el mismo alimento)

Incisión	(0) anterior	(1) lateral	(1) otra:	
Trituración	(0) dientes posteriores	(1) dientes anteriores		
	(0)Eficiente	(1) ineficiente	(1) con la lengua	
Numero de ciclos: (ver video):	Derecha:	1° porción	2° porción	3°porción
	Izquierda :	1° porción	2° porción	3°porción
	Total:	1° porción	2° porción	3°porción
Patrón masticatorio:	(0) bilateralalternado	(1) bilateral simultaneo	(2) unilateral crónico	
	(0) unilateral preferencial			
Cierre labial:	(0) Sistémico	(1) asistemico	(2) ausente	
Velocidad:	(0) adecuada	(1) aumentada	(1) disminuida	
Masticación ruidosa:	(0) no	(si)		
Contracciones musculares inhabituales	(0) ausente	(1) presentes (describir):		

Observaciones: _____

Preguntar al paciente:

Lado preferencial de masticación:	<input type="checkbox"/> derecho e izquierdo	<input type="checkbox"/> derecho	<input type="checkbox"/> izquierdo	<input type="checkbox"/> no sabe
Dolor al masticar:	<input type="checkbox"/> ausente	<input type="checkbox"/> derecho	<input type="checkbox"/> izquierdo	
Ruidos en la ATM:	<input type="checkbox"/> ausente	<input type="checkbox"/> derecho	<input type="checkbox"/> izquierdo	

Observaciones: _____

Deglución: sumar los puntos de las tres pruebas (mejor resultado = 0 y peor =39)Si se presenta alterada es de origen funcional estructural otro _____**Deglución habitual (solido)** [] sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 15)

Postura de labios:	(0) cerrados	(1) cerrados parcialmente	(1) lado inferior tocando los dientes superiores	(2) abiertos
Postura de lengua:	<input type="checkbox"/> no se ve	(0) atrás de los dientes	(1) tocando los dientes	(2) entre los dientes
Retención del alimento:	(0) adecuada	(1) parcial	(2) inadecuada	
Contracción del orbicular:	(0) adecuada	(1) leve	(2) acentuada	
Movimiento de cabeza:	(0) ausente	(1) presente		
Ruido:	(0) ausente	(1) presente		
Coordinación:	(0) adecuada	(1) se atora	(2) Tose	
Residuos después de deglutir:	(0) ausente	(1) presente		

Observaciones: _____

Deglución habitual: (líquido- agua) [] sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor =11)

Postura de lengua:	<input type="checkbox"/> no se aprecia	(0) atrás de los dientes	(1) tocando los dientes	(2) entre los dientes
Retención del líquido:	(0) adecuada	(1) inadecuada		
Volumen de líquido:	(0) satisfactorio	(1) aumentado	(1) disminuido	
Contracción del mentoniano:	(0) ausente	(1) leve	(2) acentuada	
Movimiento de cabeza:	(0) ausente	(1) presente		
Ruido:	(0) ausente	(1) presente		
Ritmo:	(0) secuencial	(1) solo por sorbo		
Coordinación:	(0) adecuada	(1) se atora	(1) tose	

Observaciones: _____

Deglución dirigida: (líquido- agua) [] sumar todos los puntos (mejor resultado= 0 y peor =13)

Colocar el agua en la boca y permanecer con ella hasta que el evaluador solicite deglutirla.

Postura labial:	(0) cerrados	(1) cerrados parcialmente	(1) labio inferior tocando los dientes superiores	(2) abiertos
Postura de la lengua:	(0) atrás de los dientes	(1) tocando los dientes	(2) entre los dientes	
Retención de líquido:	(0) adecuada	(1) parcial	(2) inadecuada	
Contracción del orbicular de la boca:	(0) adecuada	(1) poca	(2) acentuada	
Contracción del mentoniano	(0) ausente	(1) poca	(2) acentuada	
Movimiento de cabeza:	(0) ausente	(1) presente		
Ruido:	(0) ausente	(1) presente		
Coordinación:	(0) adecuada	(1) se atora	(1) tose	

Observaciones: _____

Preguntar al paciente

Dificultad para deglutir	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si (describir):	
Posición de la lengua:	<input type="checkbox"/> atrás de los dientes superiores	<input type="checkbox"/> atrás de los dientes inferiores	<input type="checkbox"/> entre los dientes <input type="checkbox"/> no sube

Habla: [] sumar los puntos de las cinco pruebas (mejor resultado = 0 y peor = 44)Si se presenta alterada, es de origen Fonético Fonético fonológico Fonológico _____En caso de que sea de origen fonético es: Funcional estructural DATM neuromuscular otros _____**Habla espontanea** [] sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor =6)

Utilizar las siguientes preguntas: "dígame su nombre y cuántos años tiene"

"dígame cuál es su ocupación (estudia, trabaja) "

"cuénteme sobre algún viaje (paseo) que le gustó"

Omisión:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Sustitución:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Distorsión acústica:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):

Habla automática: [] sumar todos los puntos (mejor resultado= 0 y peor= 6)
 Contar del 1 al 20; días de la semana y meses del año.

Omisión:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Sustitución:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Distorsión acústica:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):

Nominación de figuras: [] sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor= 8)
 Solicitar la emisión rápida y repetida, por 10 segundos, de sílabas y de la secuencia trisilábica.

Omisión:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Sustitución:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Distorsión acústica:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):

En caso de distorsión, esta se relaciona a la siguiente alteración de la lengua:
 [] interdental anterior [] interdental lateral [] ausencia o poca vibración del ápice [] vibración múltiple del ápice [] elevación del torso
 [] descenso del torso [] otras: _____

Coordinación motriz durante el habla: [] sumar todos los puntos (mejor puntuación = 0 y peor= 8)
 Solicitar la emisión rápida y repetida, por 10 segundos, de sílabas y de la secuencia trisilábica

	Velocidad		Ritmo	
	Adecuada	inadecuada	Adecuado	inadecuado
(pa)	(0)	(1)	(0)	(1)
(ta)	(0)	(1)	(0)	(1)
(ka)	(0)	(1)	(0)	(1)
(p ata ka)	(0)	(1)	(0)	(1)

Observaciones: _____

Aspectos generales: [] sumar todos los puntos (mejor resultado= 0 y peor =18)

Saliva:	(0) deglute	(1) acumula en comisura derecha y/o izquierda	(1) acumula en labio inferior	(2) escupe	(3) babea
Abertura de la boca:	(0) normal	(1) reducida	(1) exagerada		
Posición de la lengua:	(0) adecuada	(1) en el piso	(1) anteriorizada	(2) posteriorizada	(2) punta baja y laterales altas
Movimiento labial:	(0) adecuado	(1) reducido	(1) exagerado		
Movimiento mandibular:	(0) trayectoria adecuada	(1) desviado a la derecha	(1) desviado hacia la izquierda	(1) anteriorizada	
Resonancia:	(0) equilibrio oronasal	(1) uso reducido nasal	(1) uso excesivo nasal	(1) laringofaríngea	
Precisión articulatoria:	(0) adecuada	(1) imprecisión asistémica	(2) imprecisión sistémica		
Velocidad:	(0) normal	(1) aumentada	(1) reducida		
Coordinación neumofonoarticulatoria:	(0) adecuada	(1) alterada			

En caso de imprecisión está relacionado con: [] tono [] respiración oronasal [] maloclusión [] uso de prótesis [] velocidad del habla
 [] audición [] uso de medicamento [] cantidad de saliva [] abertura de la boca reducida [] alteración neurológica [] fatiga muscular
 [] ansiedad depresión [] otras: _____

Observaciones: _____

Prueba terapéutica (repetición de sílabas) solicitar la repetición de sílabas que contengan los tonos alterados, utilizando la vocal "e"
 Esta prueba es utilizada para observar ante la repetición si la producción de la articulación del libro alterado se modifica

Fonos evaluados	la producción no se altera	La producción mejora	La producción se muestra adecuada

Observaciones: _____

Voz [] sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor= 3)

Solicitar la emisión sustentada de la vocal "ä"

Pitch (frecuencia):	(0) adecuado	(1) grave	(1) agudo
Loudness (intensidad):	(0) adecuado	(1) fuerte	(1) débil
Tipo de voz	(0) adecuada	(1) alterada	

NOMBRE: _____ N° _____ Fecha de evaluación : __/__/__

Diagnostico Fonoaudiológico y conductas

Valores del examen inicial	reevaluaciones	
	(_ / _ / _)	(_ / _ / _)
<input type="checkbox"/>] POSTURA CORPORAL (mejor resultado=0 y peor= 7)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] EXAMEN EXTRAORAL (mejor resultado= 0 y peor= 17)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] rostro (mejor resultado = 0 y peor=17)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] labios (mejor resultado =0 y peor10)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] masetero (mejor resultado= 0 y peor =2)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] EXAMEN INTRAORAL (mejor resultado = 0 y peor = 57)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] labios (mejor resultado = 0 y peor = 5)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] lengua (mejor resultado = 0 y peor= 17)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] mejillas (mejor resultado= 0 y peor= 8)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] paladar (mejor resultado = 0 y peor 8)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] tonsilas palatinas (mejor resultado = 0 y peor = 5)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] dientes (mejor resultado = 0 y peor = 5)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] oclusión (mejor resultado = 0 y peor = 10)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] MOVILIDAD (mejor resultado = 0 y peor = 54)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] labios (mejor resultado = 0 y peor=54)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] lengua (mejor resultado = 0 y peor= 16)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] paladar blando (mejor resultado = 0 y peor = 4)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] mandíbula (mejor resultado = 0 y peor = 18)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] DOLOR DURANTE LA PALPACION (mejor resultado = 0 y peor= 10)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] TONICIDAD (mejor resultado =0 y peor = 6)	[]	[]
<input type="checkbox"/>]labios (superior+ inferior) (mejor resultado = 0 y peor= 2)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] mentoniano (mejor resultado = 0 y peor = 1)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] lengua (mejor resultado = 0 y peor = 1)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] mejillas (derecha + izquierda) (mejor resultado = 0 y peor= 2)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] FUNCIONES OROFACIALES (Mejor resultado = 0 y peor = 103)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] respiración (mejor resultado = 0 y peor = 7)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] masticación (mejor resultado = 0 y peor = 10)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] deglución (mejor resultado = 0 y peor 39)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] habla (mejor resultado = 0 y peor = 44)	[]	[]
<input type="checkbox"/>] voz (mejor resultado = 0 y peor = 3)	[]	[]

Datos recolectados de exámenes recibidos de otros profesionales:

Exámenes solicitados:

Otras alteraciones:

Hipótesis diagnostica Fonoaudiológica:

Pronóstico:

Plan terapéutico:
